

## Ptačí chřipka u koček – doporučení Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), 1.3.2006

*Veterinární úvod zpracovaný Státní veterinární správou ČR dne 2.3.2006*

Informace o pozitivním nálezu viru H5N1 u kočky přišla z Německa, z oblasti, která je silně postižena výskytem této nákazy. Jsou zde nalézány stovky uhynulých ptáků. Proto je zde možný kontakt koček s nemocnými ptáky a proto jsou zde možné i ojedinělé případy přenosu této nákazy na kočky. I v tomto případě však platí, že přenos ptačího viru na savce je poměrně obtížný a je nutná vysoká infekční dávka a případná imunitní deficeience. V ČR dosud nebyl zaznamenán výskyt vysoce patogenního viru H5N1, proto i riziko přenosu nákazy na kočky je nulové. Pokud k nám bude virus ptačí chřipky zanesen, určitě to nebude kočkami. Z toho důvodu veterináři prozatím nepřijímají v tomto směru žádná opatření. V případě, že dojde k výskytu vysoce patogenní ptačí chřipky i na území ČR, budou neprodleně přijata adekvátní opatření i v tomto směru. V tuto chvíli ovšem plně dostačuje dodržovat při kontaktu s kočkami základní hygienická pravidla.

*Překlad informací ECDC z data uvedeného výše*

Mrtvá kočka nalezena v severním Německu byla infikována virem chřipky typu A/H5N1.

- toto není žádné překvapení. Obdobné případy byly hlášeny například ze ZOO v Bangkoku, kde se virem H5N1 nakazilo 45 tygrů, kteří byli krmeni slepicemi infikovanými virem H5N1. Další nákaza koček virem H5N1 byla hlášena i z Thajska. V Rotterdamu, v Erasmus Medical Centre byly již v roce 2004 provedeny studie, dokazující relativně zvýšenou vnímavost koček na virus H5N1
- to, že se zjistila nákaza virem H5N1 u kočky, ukazuje na výbornou surveillance v zemích EU
- tento nález nepotvrzuje žádné změny viru svědčící pro mutaci

*Upozornění:* provizorní doporučení uvedené níže, je vypracováno k datu 1.3.2006 a vychází z omezených údajů.

### Doporučení ECDC

Následující doporučení by se mělo aplikovat **v zóně 10 km od nálezů ptáka s verifikovanou nákazou virem chřipky typu A/H5N1**. Zvětšení této zóny je možné po zhodnocení míry rizika.

- držet domestikované kočky v domech, aby se zabránilo potencionálnímu kontaktu koček s infikovanými ptáky
- držet částečně domestikované a toulavé kočky vně svých obydlí, aby se zabránilo možnému těsnějšímu kontaktu mezi kočkami a lidmi
- když zjistíte, že je vaše kočka nemocná nebo byla v potencionálním kontaktu s nemocným ptákem, kontaktujte nejbližšího veterináře
- každé úmrtí kočky oznamte místnímu veterináři

Odstraněno: ¶

¶  
¶  
¶