

STAHOVANÁ KOJENECKÁ VÝŽIVA: DOPORUČENÝ POSTUP PRO RODIČE

V souvislosti s opakovaným stahováním některých výrobků kojenecké výživy zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví doporučený postup pro rodiče, kteří svým dětem podávali dotčené výrobky.

Přehled opakovaně stahovaných výrobků kojenecké výživy je zveřejněn na webových stránkách [Státní zemědělská a potravinářská inspekce](#) a také přímo na webu [Ministerstva zdravotnictví](#).

Opakované stažení se týká následujících výrobků s dotčeným datem minimální trvanlivosti (DMT):

- **Nutrilon Profutura Duobiotik 1, 800 g – DMT: 10. 3. 2027, 13. 5. 2027 a 5. 11. 2027,**
- **Nutrilon Advanced 2, 800 g – DMT: 16. 9. 2026, 21. 11. 2026 a 20. 12. 2026,**
- **Nutrilon Advanced 2, 1 kg – DMT: 27. 8. 2026, 4. 11. 2026, 24. 12. 2026 a 18. 2. 2027.**

Cereulid je toxin produkovaný některými kmeny bakterie *Bacillus cereus*. Po jeho požití se příznaky objevují obvykle do 8 hodin po konzumaci a nejčastěji se jedná o zažívací obtíže, zejména nevolnost a zvracení. U kojenců je hlavním rizikem rychlá dehydratace.

1. Okamžitě přestaňte podávat danou výživu

- Ověřte, zda se jedná o výrobek uvedený v oznámení o stahování výrobku (odkaz uveden výše).
- Pokud se jedná o dotčený výrobek, výrobek dále nepodávejte, a to ani v případě, že dítě nevykazuje zdravotní obtíže.

2. Uschovejte otevřený i uzavřený výrobek pro případné vyšetření

- Pokud máte k dispozici **neotevřené balení** stahovaného výrobku kojenecké výživy, uschovejte jej v původním obalu. Pro mikrobiologické vyšetření je nutné předložit **neotevřené (originálně uzavřené) balení kojenecké výživy**. Po otevření může dojít k druhotné kontaminaci výrobku mikroorganismy z okolního prostředí, při manipulaci nebo skladování. U otevřeného balení proto již nelze spolehlivě určit, zda případně zjištěné mikroorganismy pocházely z výrobku, nebo se do něj dostaly až po jeho otevření.

Otevřené balení výrobku může být využito v rámci epidemiologického šetření jako důkazní materiál k ověření možné souvislosti mezi jeho konzumací a zdravotními obtížemi dítěte.

3. Sledujte zdravotní stav dítěte po konzumaci kojenecké výživy

Příznaky se mohou projevit zejména:

- zvracením,
- nevolností,
- průjmem,
- neklidem nebo zvýšenou plačtivostí,
- sníženým příjmem tekutin.

Zvláště kojenci mladší 6 měsíců jsou náchylnější k dehydrataci a poruchám minerálové rovnováhy.

4. Kontaktujte lékaře

Doporučuje se kontaktovat registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, pokud:

- se u dítěte objeví zvracení nebo jiné zažívací obtíže,
- potíže přetrvávají nebo se zhoršují,
- dítě odmítá přijímat tekutiny nebo stravu,
- máte jakékoli pochybnosti o jeho zdravotním stavu.

Lékaři je důležité mimo jiné sdělit popis příznaků a kdy se objevily, informace o množství konzumované výživy a její přesnou identifikaci, údaje o dalším stravování dítěte (kojení, příkrmy).

Neprodleně vyhledejte lékařské ošetření, pokud se objeví:

- opakované nebo silné zvracení,
- známky dehydratace (suché sliznice, vpadlá fontanela, méně močení, výrazná ospalost),
- porucha vědomí,
- celkové zhoršení stavu dítěte.

Hospitalizace bývá někdy nutná právě z důvodu dehydratace.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje rodičům, aby v případě jakýchkoli pochybností neváhali kontaktovat svého registrujícího dětského lékaře. V případě podezření na onemocnění související s konzumací dotčené stahované kojenecké výživy se mohou následně obrátit rovněž na místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, která provede epidemiologické šetření s cílem ověřit možnou souvislost mezi konzumací výrobku a vznikem zdravotních obtíží.