

Zjistěte, izolujte, informujte: Urgentní příjem

Hodnocení a péče o pacienty s podezřením na nákazu virem Ebola

1. Zhodnoťte, zda se pacient mohl nakazit:

Žil nebo cestoval pacient do země, kde je možný výskyt Eboly nebo byl v kontaktu s osobou, u níž byl virus Eboly potvrzen během uplynulých 21 dní?

NE

Postupujte dle obvyklých postupů pro triáž a vyšetřování pacientů

ANO

2. Určete příznaky a symptomy:

Horečka (subjektivní nebo $\geq 38^{\circ}\text{C}$) nebo Ebola – symptomy: bolest hlavy, slabost, bolest svalů, zvracení, průjem, bolest břicha nebo krvácení.

NE

Postupujte dle obvyklých postupů pro triáž a vyšetřování pacientů

ANO

ANO

3. Izolujte a určete potřebné osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)

Umístěte pacienta na samostatném pokoji nebo na pokoji s možností individuální izolace a vlastním sociálním zařízením nebo klozetovým křeslem s možností zakrytí. Péči o pacienta zabezpečují pouze určení zaměstnanci, čímž je minimalizováno riziko dalšího přenosu. Používání OOPP je závislé na zdravotním stavu pacienta:

- Pokud pacient krvácí, zvrací, má velký průjem nebo na základě zdravotního stavu je zřejmé, že bude nutné provést invazivní výkon nebo výkon AGP? (např. intubace, odsávání, aktivní resuscitace)?

4. Informujte

- NEPRODLENĚ informujte Program prevence a kontroly infekcí a další pracovníky, zabývající se danou oblastí
- NEPRODLENĚ podejte zprávu Ministerstvu zdravotnictví.

NE

ANO

V případě pacienta ve stabilizovaném zdravotním stavu, by měli zdravotničtí pracovníci minimálně použít tyto OOPP:

- Obličejový štít, chirurgickou obličejovou ústenku
- Nepropustný plášť
- 2 páry rukavic

Pokud se pacientův zdravotní stav změní, přehodnoťte OOPP.

- Používejte OOPP, které jsou určeny pro poskytování péče hospitalizovaným pacientům
<http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/procedures-for-ppe.html>
- Pokud pacient potřebuje aktivní resuscitaci, musí mu být poskytnuta v předem vytvořené místnosti, která používá předem připravené zařízení.

5. Další vývoj a řízení

- Úplná anamnéza a fyzikální vyšetření; rozhodnutí o testování na přítomnost viru Eboly, by mělo být provedeno na základě konzultací s Ministerstvem zdravotnictví.
- Provádění rutinních výkonů (např. zavedení periferního žilního katétru, flebotomie), které jsou indikovány na základě zdravotního stavu pacienta.