

Výskyt pohlavních nákaz v Moravskoslezském kraji

Ke dni 16.1.2023 bylo za rok 2022 v Moravskoslezském kraji hlášeno celkem 288 případů pohlavních nákaz, což odpovídá nemocnosti 24,4 případů/100 000 obyvatel. Ve 47 případech (nemocnost 4,0/100 000 obyvatel) se jednalo o onemocnění příjící neboli syfilis (dg. A50 – A53), ve 239 případech (nemocnost 20,3/100 000 obyvatel) o onemocnění kapavkou, tj. gonokokovou infekcí (dg. A54) a ve 2 případech o onemocnění *lymphogranuloma venerum* (dg. A55). Onemocnění byla hlášena ze všech okresů v rámci Moravskoslezského kraje.

Téměř tři čtvrtiny onemocnění, tj. 205 případů (71,7 %) se vyskytlo u mužů a 7 případů (2,6 %) onemocnění bylo zjištěno u cizinců. Nejvyšší počty onemocnění byly zaznamenány u dospělých ve věku 30-39 let (38,9 %) a 20-29 let (29,8 %).

V roce 2021 bylo hlášeno celkem 272 případů kapavky (22,8/100 tis. obyvatel) a 50 případů onemocnění syfilidou (4,19/100 tis. obyvatel).

Nejčastější pohlavní nákazou, která bývá v Moravskoslezském kraji hlášena, je dlouhodobě **kapavka**.

Příznaky a léčba pohlavních nákaz:

Klinicky se onemocnění pohlavní nákazou projevuje nejčastěji buď výtokem z pochvy nebo močové trubice, kožními změnami v okolí genitálu nebo konečníku, také v ústech a na rtech v případě orálního sexu. Jakékoliv změny na genitáliích by měly být, proto vyšetřeny odborným lékařem. Kapavka, syfilis a lymphogranuloma venereum se léčí antibiotiky. U syfilis je vyžadována dle platné legislativy léčba za hospitalizace.



U kapavky ve srovnání s minulými lety pozorujeme také postupně narůstající rezistenci (odolnost) bakterií způsobujících kapavku vůči klíčovým antibiotikům, kterými byla kapavka léčena. V roce 2022 bylo zaznamenáno 63,4 % rezistentních původců kapavky (bakterie *Neisseria gonorrhoeae*). S nárůstem anonymních, nezávazných sexuálních kontaktů narůstá problém s dohledáním zdrojů nákazy, které proto nejsou adekvátně léčeny a k šíření nákazy dochází dál. Není také výjimkou, že někteří jedinci mají zároveň více pohlavně přenosných nákaz, včetně HIV či opakované reinfekce syfilis. Léčba kapavky, která je laicky považována za banální nákazu, patří do rukou lékaře, v žádném případě se nelze spoléhat na laické návody a doporučení např. na internetu.


Prevence pohlavních nákaz:

Proti původcům kapavky, syfilidy či pohlavní nákazy způsobené *Chlamydia trachomatis* není k dispozici žádná vakcína. **Proto je nezbytné v případech náhodného sexu s neznámými partnery vždy používat kondomy.**

Co dělat v případě podezření či onemocnění pohlavní nákazou

- Neprodleně navštívit ambulanci lékaře dermatovenerologa.
- V rámci depistážního šetření uvést všechny sexuální kontakty, aby se včas zamezilo dalšímu šíření nákazy.
- Aktivní vyhledání sexuálních partnerů/partnerek spočívá v oznámení poskytovateli zdravotní péče těchto osob podezřelých z nákazy, které jsou následně oslovovány, vyšetřeny a léčeny.
- bezpečný sex, včasná léčba nemocných a vyšetření jejich rizikových sexuálních kontaktů.

Hlášená infekční onemocnění kapavkou a syfilidou v Moravskoslezském kraji v letech 2012-2022 (průběžná data)



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Tel: 595 138 111

podatelna@khsova.cz, www.khsova.cz, ID datové schránky: w8pai4f