

## Výskyt dáivého (černého) kašle – stále aktuální

V roce 2013 došlo k dalšímu nárůstu dáivého kašle v České republice. K 46. kalendářnímu týdnu 2013 bylo hlášeno 931 případů tohoto onemocnění, což představuje zatím nárůst o 26% oproti roku 2012. V Moravskoslezském kraji sice nemocnost je významně nižší než v kraji Libereckém, Vysočina či Karlovarském, přesto chceme občany upozornit na toto onemocnění a zejména informovat o jeho příznacích a jeho prevenci.

**Černý neboli dáivý kašel** (pertuse) je vysoce infekční onemocnění dýchacího traktu, který se typicky projevuje záchvaty kašle trvajících někdy i řadu týdnů. Záchvaty kašle jsou zpočátku suché a dráždivé (1-2 týdny), pak nastupuje období typického, dráždivého kašle se zajíkáním a vykašláváním hlenů (1-2 měsíce i déle) a v posledním stadiu záchvaty kašle pomalu ustávají, jedná se o dobu rekonvalescence, která je poměrně dlouhá, trvá až několik týdnů. Záchvaty kašle mohou být provázeny zvracením, vysokou teplotou, celkovým vyčerpáním a ztrátou váhy.

Původcem onemocnění je bakterie *Bordetella pertusis*, kterou se můžeme nakazit kapénkami pouze od člověka, který právě prodělává akutní onemocnění. Inkubační doba je nejčastěji 7-10 dní.

K preventivním opatřením patří očkování, které se provádí u dětí v prvních měsících života kombinovanou očkovací látkou. První přeočkování se aplikuje u dětí mezi pátým a šestým rokem dítěte a druhé přeočkování při dovršení desátého roku.

Udává se, že imunita proti černému kašli přibližně po 4 až 12 letech po očkování postupně vymizí. To znamená, že dospělí, kteří byli očkováni v dětství nejsou již proti černému kašli chráněni.

V ČR jsou na trhu vakcíny, kterými se mohou očkovat všechny věkové kategorie jako prevence před onemocněním černým kašlem.

Očkování se doporučuje nastávajícím maminkám, rodinným příslušníkům novorozenců, včetně starších sourozenců a prarodičů a dalších blízkých kontaktů novorozence s cílem ochrany neočkovaných či neúplně očkovaných novorozenců a kojenců.

### Výskyt pertuse v MSK a ČR

Rok	Hlášeno případů (absolutně)		Relativní výskyt na 100 tis.	
	MSK	ČR	MSK	ČR
2008	23	767	1,8	7,4
2009	24	955	1,9	9,1
2010	37	662	3,0	6,3
2011	12	324	1,0	3,1
2012	44	738	3,6	7,0
2013*	19	931	1,5	8,8

\* výskyt k 15.11.2013, zdroj: EPIDAT

Výskyt pertuse v ČR a MSK (relativní počty/100 tis. obyv.)

