

**KRAJSKÁ
HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE SE SÍDLEM
V OSTRAVĚ**



Vliv kvality ovzduší na lidské zdraví

3.11.2011, Klub Atlantik Ostrava

MUDr. Helena Šebáková

Bc. Eva Kolářová

RNDr. Jiří Urbanec

helena.sebakova@khsova.cz

595 138 200

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava tel: 595 138 111, fax: 595 138 109 www.khsova.cz, podatelna@khsova.cz


Obsah



- Základní zdravotní ukazatele ve vztahu k ovzduší - úmrtnost a incidence vybraných onemocnění
- Výskyt akutních respiračních onemocnění a alergie
- Srovnání uvedených ukazatelů za ČR, MS kraj, Ostravu
- Teoretický odhad vlivu PM10 na zdraví obyvatel za období 2001-2010 (stručný souhrn)
- Závěr

Střední délka života při narození

Střední délka života při narození



Střední délka života 2005 - muži

Bruntál	70,7
Frýdek-Místek	71,3
Karviná	70,3
Nový Jičín	71,0
Opava	71,4
Ostrava	70,9



Střední délka života 2005 - ženy

Bruntál	78,0
Frýdek-Místek	78,5
Karviná	77,8
Nový Jičín	78,5
Opava	78,7
Ostrava	78,1



Střední délka života 2005 - MSK a ČR


MSK muži	71,3
ČR muži	72,9
MSK ženy	78,6
ČR ženy	79,1

Zdroj: ÚZIS

Standardizovaná úmrtnost



SDR celkem





Zdroj: ÚZIS

Standardizovaná úmrtnost – nemoci dýchací soustavy

SDR na nemoci dých. s. - muži



2009



Česko
63

SDR na nem. dých. s. - ženy

2009



Česko
30,9

Bruntál	89,0
Frýdek-Místek	86,8
Karviná	72,6
Nový Jičín	60,1
Opava	75,1
Ostrava	61,1

ČR 63,0
MSK 72,0

ČR 30,9
MSK 32,1


Bruntál	36,4
Frýdek-Místek	36,5
Karviná	31,3
Nový Jičín	21,2
Opava	30,5
Ostrava	34,3

Zdroj: ÚZIS

Standardizovaná úmrtnost – nemoci dýchací soustavy



SDR nemoci dýchací soustavy




Zdroj: ÚZIS

Standardizovaná úmrtnost - novotvary


Zemřelí na ZN- dg C 33,C 34 - evr. stand. - muži

2007



Zemřelí na ZN- dg C 33,34 - evr. stand. - ženy

2007



ČR 71,3
MSK 77,5

Bruntál	103,4
Frydek-Místek	62,2
Karviná	92,9
Nový Jičín	68,4
Opava	71,7
Ostrava	74,7

ČR 19,1
MSK 16,8


Bruntál	10,8
Frydek-Místek	12,2
Karviná	16,3
Nový Jičín	18,4
Opava	13,0
Ostrava	22,8

Zdroj: ÚZIS

Standardizovaná úmrtnost - novotvary



Zemřelí na ZN - dg C 33, 34, evr. stand.





Zdroj: ÚZIS

Zhoubné novotvary - incidence

Zhoubné novotvary - dg C 33,34 - evr. stand. - muži

2007





Česko
81,5

Bruntál	118,6
Frýdek-Místek	58,3
Karviná	89,5
Nový Jičín	77,7
Opava	67,8
Ostrava	91,2

ČR 81,5
MSK 82,1

Zhoubné novotvary - dg C 33,C 34- evr. stand. - ženy

2007




Česko
24,2

Bruntál	15,9
Frýdek-Místek	17,2
Karviná	22,5
Nový Jičín	26,5
Opava	15,4
Ostrava	28,0

ČR 24,2
MSK 22,2

Zdroj: ÚZIS

Zhoubné novotvary plic - incidence




Zdroj: ÚZIS


Kojenecká a novorozenecká úmrtnost



Kojenecká úmrtnost



Novorozenecká úmrtnost





Novorozenecká úmrtnost

Zdroj: ÚZIS

Živě narození s vrozenou vadou, s nízkou porodní hmotností

Živě narození s vrozenou vadou



Podíl živě narozených s nízkou porodní hmotností


Pozn.: 8 % Ostrava = 289 dětí

Zdroj: ÚZIS

Živě narození s vrozenou vadou na 10 tisíc živě narozených



Průměrný počet živě narozených dětí s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených
(za období 2005–2009)




Zdroj: ÚZIS

Počet dispenzarizovaných pacientů alergologie na 10 tis. obyvatel



	ČR	MSK	okres Ostrava
2006	907,2	969,3	1141,5
2007	890,3	960	1143,1
2008	832,3	989,2	1137,4
2009	972,0	846,5	1050
2010	970,0	850,0	1096,1



Zdroj: ÚZIS


Počet dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu na 10 tis. obyvatel MS kraje v roce 2010

Dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu

Vybraná onemocnění (diagnóza MKN-10)	Počet dispenzarizovaných osob						
	celkem	z toho ve věku (v %)				kraj na 10 tis. obyvatel	ČR na 10 tis. obyvatel
		0-5 let	6-14 let	15-19 let	20 let a více		
Atopická dermatitis (L20.-)	10 171	24,0	24,0	17,4	34,6	81,81	80,98
Pollinosa (J30.1)	44 329	4,6	25,3	22,8	47,3	356,57	324,82
Stálá alergická rýma (J30.3)	20 111	7,0	19,4	19,5	54,1	161,77	159,27
Astma (J45.-)	40 621	6,6	21,3	19,2	53,0	326,74	273,17

Zdroj: ÚZIS

Počet dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu na 10 tis. obyvatel




Zdroj: ÚZIS

Počet dispenzarizovaných pacientů - astma na 10 tis. obyvatel



	ČR	MSK	okres Ostrava
2006	244,0	260,4	385,0
2007	256,2	291,3	382,3
2008	257,4	298,4	394,7
2009	266,5	315,8	428,8
2010	273,2	326,7	460,3




Zdroj: ÚZIS

Dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu na 10 tis. obyvatel dle okresů v roce 2010

	Atopická dermatitida	Pollinosis	Stálá alergická rýma	Astma
Bruntál	33,99	301,33	165,97	232,41
Frydek-Místek	175,81	561,29	161,20	272,75
Karviná	52,62	290,15	168,34	301,58
Nový Jičín	85,63	339,29	188,82	387,48
Opava	57,44	208,93	88,36	177,90
Ostrava	70,87	382,70	182,21	460,31
MS kraj	81,81	356,57	161,77	326,74
ČR	80,98	324,82	159,27	273,17


Zdroj: ÚZIS

Akutní respirační onemocnění



Zdroj: KHS, ČHMÚ

Akutní respirační onemocnění ve věkové skupině 0 až 5 let



Zdroj: KHS

Posouzení vybrané nemocnosti a úmrtnosti za období 2001 až 2010



- Ze sledovaných zdravotních ukazatelů jsou znečištěním ovzduší nejvíce ovlivněny respirační potíže dětí (LRS), kde atributivní proporce případů dosahuje v topných sezónách až 17,8 %, ale i v netopných sezónách se pohybuje na maximální hodnotě AP 7,2 %.
- Významně jsou ovlivněny i LRS symptomatických dospělých, kde AP v topných sezónách dosahuje maximální hodnoty 8,5 %, ale i v netopné sezóně se dostává na hodnotu 3,0 %.

Posouzení vybrané nemocnosti a úmrtnosti za období 2001 až 2010



- Návazně jsou pak ovlivněny i hospitalizace z respiračních příčin, kdy vlivem znečištění ovzduší PM_{10} mohlo dojít až k 5,2 % zvýšení hospitalizací v topné sezóně, 3,5 % v přechodné a 1,8 % v netopné sezóně.
- Nejméně ze sledovaných zdravotních ukazatelů a téměř stejně je ovlivněna celková úmrtnost a hospitalizace z kardiálních příčin. Vlivem znečištění ovzduší PM_{10} mohlo docházet ke zvýšení až o 3,2 % v topné sezóně, 2,2 % v přechodné a 1,1 % v netopné sezóně.

Posouzení vybrané nemocnosti a úmrtnosti za období 2001 až 2010



- Na základě teoretických výpočtů je pravděpodobné, že znečištění ovzduší PM_{10} ve městě Ostravě může ovlivnit zdravotní stav obyvatel města a vést ke zvýšení celkové úmrtnosti i nemocnosti ve srovnání s populací, která není exponována zvýšeným koncentracím PM_{10} .
- Na tyto výpočty je nutno se dívat jako na teoretické odhady, jejichž základem nejsou údaje o konkrétní populaci města, ale prokázané vztahy mezi koncentracemi PM_{10} a zdravotními ukazateli v metaanalýzách WHO.

Závěr



- Stav ovzduší na území MS kraje, zejména v ostravsko-karvinské oblasti, s ohledem na suspendované částice prachu frakcí PM10 a PM2,5 se řadí k faktorům, které jsou rizikové ke zdravotnímu stavu obyvatel.
- Kritéria překročení imisního limitu pro suspendované částice prachu frakce PM10 jsou naplněna pro cca 3/4 obyvatel kraje.

Závěr



- Pro mnohé polutanty neexistuje bezpečná koncentrace bez dopadu jejich účinků na zdraví, ale zároveň také neexistuje tak čisté ovzduší, které by vylučovalo expozici cizorodým škodlivým látkám. Je proto nutné hledat míru přijatelného rizika pro člověka a jeho zdraví.

Závěr



- Interpretace jednotlivých zdravotních ukazatelů je složitá vzhledem k možným multifaktoriálním příčinám.
- Alergická onemocnění jsou diagnostikována u 1/3 dětí. Nejčastější onemocnění jsou alergická rýma pylová, astma a atopický ekzém. Trvá stálý nárůst počtu alergických onemocnění ve všech věkových skupinách, nejzávažnějším problémem je astma.
- Nejvyšší nemocnost na ARI je ve věkové skupině 0 až 5 let.

Závěr



- Nemůžeme opomíjet význam socioekonomických faktorů, psychosociálního stresu a životního stylu ve vztahu ke zdraví.
- Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti ve věku 0 až 5 let a dospělí nad 60 let, na které je třeba se zaměřit v rámci prevence a podpory zdraví.



*„Zdraví není všechno,
ale všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic.“
Halldan Mahler*

Děkuji za pozornost.