

Akutní respirační infekce v Moravskoslezském kraji stav ke dni 14. 2. 2020

V 7. kalendářním týdnu klesla v Moravskoslezském kraji nemocnost na akutní respirační infekce (ARI) o 9,4 % na 1962 případů na 100 000 obyvatel.

Nejvyšší počet nemocných byl hlášen z okresu Bruntál, kde onemocnělo 3044 osob na 100 000 obyvatel. Stále přetrvává nejvyšší specifická nemocnost ve věkové skupině 0 - 5 let, která dosáhla na 4500 případů na 100 000 obyvatel.

Na LSPP se podíl osob ošetřených pro akutní respirační infekce pohyboval v rozmezí od 17,2 % do 53 %.

V Moravskoslezském kraji k tomuto kalendářním týdnu přibylo sedm nových případů chřipky typu A se závažným klinickým průběhem, který vyžadoval hospitalizaci na oddělení ARO a JIP. Ve čtyřech případech byl detekován subtyp A/H1N1pdm.

Nemocní byli z okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Opava a Ostrava-město, jednalo se o muže s přidruženými chronickými chorobami, ve věkovém rozmezí 47-70 let, proti chřipce nebyli očkovaní.

Situace v ČR:

V 6. kalendářním týdnu byl zaznamenán nárůst detekce viru chřipky typu A. Bylo vyšetřeno 1292 vzorků, z toho v 594 (46 %) případech s pozitivní detekcí některého z respiračních virů, ve 460 (36 %) případech byl detekován virus chřipky typu A, pouze ve 21 (2 %) případech byl detekován virus chřipky typu B. V České republice, na rozdíl od většiny evropských zemí, výrazně dominoval subtyp A/H3N2 nad subtypem A/H1N1pdm.


Nemocnost v jednotlivých krajích se od sebe významně nelišila, nejvyšší výskyt byl zaznamenán v Plzeňském, Moravskoslezském, Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji.

Situace v Evropě:

Chřipková aktivita v Evropě stále vzrůstá. Ve většině zemí bylo zaznamenáno plošné rozšíření, vysoká aktivita byla hlášena z 9 zemí, střední aktivita z 13 zemí, a v 16 zemích byla hlášena aktivita chřipky nízká.

Ve většině evropských zemí se nejvíce uplatňovala chřipka typu A, subtyp A/H1N1pdm (64 %). V osmi členských státech byla evidována kodominance chřipky typu A i B, a ve čtyřech státech dominance chřipky typu B, přičemž se v drtivé většině jednalo o linii B/Victoria.

Zdroj: www.szuz.cz



Zdroj: www.drugtargetreview.com