

Epidemiologická situace v Moravskoslezském kraji v září 2026

V září bylo v Moravskoslezském kraji (dále jen v „MSK“) hlášeno celkem **1 736** infekčních onemocnění, což odpovídá nemocnosti 149 případů na 100 000 obyvatel. V tomto období onemocnělo 840 mužů a 896 žen. Bylo hlášeno **39 úmrtí v souvislosti** s probíhajícím infekčním onemocněním.

Epidemické výskyty


V září byl šetřen **1 hromadný výskyt** akutní gastroenteritidy u účastníků adaptačního pobytu ostravského gymnázia. Z celkem 22 účastníků onemocnělo 18 osob (17 studentů a 1 pedagog). Onemocnění mělo lehký průběh, s odezněním příznaků nejčastěji do dvou dnů. Původce onemocnění se nepodařilo objasnit.

Epidemie virové žloutenky typu A (dále jen „VHA“) pokračovala i v září, kdy bylo hlášeno **19 nových případů**. Ve stejném období minulého roku bylo zaznamenáno 21 případů onemocnění. Od začátku roku 2024 do konce září 2026 bylo v MSK evidováno celkem **628 případů VHA**, včetně 5 úmrtí dospělých osob.

Vývoj počtu případů VHA v jednotlivých okresech MSK od 1. do 40. kalendářního týdne roku 2026, je znázorněn v grafu č. 1.

Nejúčinnější **prevencí VHA je očkování**. Důležité je také **důsledné mytí rukou**, zejména po použití toalety, před jídlem a po návratu z veřejných prostor.

Graf č. 1 Hlášené případy onemocnění VHA v MSK dle okresů a kalendářních týdnů



Zdroj: ISIN, KHS MSK

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Tel: 595 138 111

podatelna@khssova.cz, www.khssova.cz, ID datové schránky: w8pai4f

Virové záněty jater

- 19 případů **virového zánětu jater typu A** (11x Ostrava-město, 5x Karviná, 3x Frýdek-Místek),
- 1 případ **akutního virového zánětu jater typu C** (Opava)
- 7 případů **chronického virového zánětu jater typu C** (2x Bruntál, 1x Karviná, 1x Nový Jičín, 3x Ostrava-město),
- 3 případy **chronického virového zánětu jater typu B** (2x Bruntál, 1x Nový Jičín),
- 7 případů **virového zánětu jater typu E** (1x Nový Jičín, 1x Bruntál, 1x Karviná, 1x Opava, 3x Ostrava-město).

Parazitární nákazy


- 187 případů **svrabu** (30x Bruntál, 15x Frýdek-Místek, 39x Karviná, 9x Nový Jičín, 36x Opava, 58x Ostrava),
- 3 případy **protozoární střevní nemoci** (původce: *Dientamoeba fragilis* z okresu Karviná (1) a Ostrava (1), původce *Endolimax nana* z okresu Ostrava (1)).

Vybraná akutní průjemová onemocnění

- 198 případů **kampylobakteriízy**,
- 107 případů **salmonelózy**,
- 118 případů **jiných bakteriálních průjemových onemocnění**,
- 18 případů **bacilární úplavice** (1x původce *Shigella flexneri*, 17x *Shigella sonnei*), v jedenácti případech se jednalo o importované onemocnění, 10x po návratu z Egypta a 1x ze Slovenska,
- 208 případů **virových průjemových onemocnění**.

Vývoj počtu hlášených případů salmonelózy, kampylobakteriízy a virových střevních infekcí v MSK podle měsíce hlášení od 9/2024 do 9/2026 je znázorněn v grafu č. 2.

Graf č. 2 Hlášené případy salmonelózy, kampylobakteriízy a virových střevních infekcí v MSK podle měsíce hlášení od 9/2024 do 09/2026



Zdroj: ISIN, KHS MSK

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Tel: 595 138 111

podatelna@khsoba.cz, www.khsoba.cz, ID datové schránky: w8pai4f

Onemocnění přenášena klíšťaty

- 166 případů **lymeské boreliózy**,
- 5 případů **klíšťové encefalitidy** (1x Bruntál, 1x Frýdek-Místek, 1x Karviná, 2x Ostrava-město).

Další vybraná hlášená infekční onemocnění:

- 3 případy **legionelózy** (1x Frýdek-Místek, 1x Karviná, 1x Opava),
- 1 případ **pontiacké horečky** (1x Karviná),
- 1 případ **leptospirózy** z okresu Ostrava-město.



Leptospiróza je zoonotické infekční onemocnění způsobené bakteriemi rodu *Leptospira*, které se může přenášet ze zvířat na člověka, nejčastěji kontaktem s vodou či půdou kontaminovanou močí infikovaných zvířat. Ve vlhkém prostředí mohou leptospiry přežívat týdny až měsíce v závislosti na podmínkách prostředí. Onemocnění může probíhat ve dvou fázích. **První fáze** se obvykle projevuje příznaky podobnými chřipce, jako jsou bolesti hlavy, zimnice, bolesti svalů a zvracení. **Ve druhé fázi** jsou nejčastějšími příznaky horečka,

žloutenka, bolesti břicha a průjem. V těžkých případech **může dojít až k selhání orgánů**. Leptospiróza se vyskytuje celosvětově s výjimkou polárních oblastí. V České republice je hlášena sporadicky. Je zařazena mezi nemoci podléhající povinnému hlášení.



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Tel: 595 138 111

podatelna@khssova.cz, www.khssova.cz, ID datové schránky: w8pai4f