

Spalničky – vývoj epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji, stav k 20.2.2019


Od 1. ledna tohoto roku do 20.2.2019 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 21 případů onemocnění spalničkami. Nemocnost na spalničky v Moravskoslezském kraji činí 1,4 případů /100 obyvatel a patří v České republice k třetí nejvyšší nemocnosti po Praze a Plzeňském kraji.

86% případů onemocnění bylo zaznamenáno na území města Ostravy, k 1 případu došlo v okrese Frýdek-Místek a 2 případy byly zaznamenány v okrese Bruntál. Pouze jeden případ byl importovaný z Polska u neočkovaného dospělého, ostatní nemocní pobývali na území města Ostravy. 2 případy onemocnění byly zaznamenány mezi zdravotníky. Onemocnění postihlo osoby ve věku 0-56 let, 9 dětí, 12 dospělých. 71% nemocných proti spalničkám nebylo vůbec očkováno, případně bylo očkováno pouze 1 dávkou vakcíny v dětství, která nezaručuje dostatečnou ochranu. 6 nemocných dětí nebylo očkováno s ohledem na nízký věk, 2 děti očkované být mohly, ale k očkování se nedostavily, 6 dospělých bylo v dětství řádně očkováno a došlo u nich k tzv. vyvanutí imunity(viz graf č. 5) .


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v uvedeném období zajišťovala rozsáhlá protiepidemická opatření v souvislosti se 17 ohnisky nákazy u 1215 exponovaných osob na území kraje, vydala 165 rozhodnutí ke karanténě osobám, které přišly do kontaktu se spalničkami a jsou k nakaže vnímavé. S ohledem na vysokou nakažlivost virem spalniček, epidemický výskyt na území hlavního města Prahy či v okolních státech a nízkou proočkovanost lze očekávat další šíření nákazy.

Proto doporučujeme se řídit pokyny uvedenými v letáku.


Graf č. 1




Graf č. 2




Graf č. 3



Graf č. 4



Graf č. 5



Spalničky – informace o onemocnění a opatření k zamezení šíření

Spalničky – vysoce nakažlivé virové onemocnění

Přenos nákazy:

- od nemocného člověka kapénkami, přímým kontaktem s jeho nosními sekrety
- nepřímo předměty čerstvě potřísněnými těmito sekrety, méně často

Inkubační doba:

- 7 – 21 dní (doba od vniknutí původce nákazy do organismu do prvních příznaků onemocnění)

Příznaky:

- horečka, kašel, rýma, světlolachost a zarudnutí očních spojivek
- v ústech a na sliznici tváří mohou být bělavé tečky se zarudlým okolím
- 4.-5. den se objeví sytě červená až fialová vyrážka, začíná na záhlaví, šíří se na obličej, krk, břicho a končetiny (ve stejném pořadí ustupuje)
- jakmile vyrážka postihne celé tělo, klesá teplota a nastává rekonvalescence

Komplikace: zápal plic, zánět středního ucha, vedlejších nosních dutin, zánět mozku

Období nakažlivosti:

- nemocný je **nakažlivý** již 4 dny před objevením vyrážky
- nakažlivost končí do 4 dnů po vzniku vyrážky

Prožití nákazy zanechává celoživotní imunitu.

Léčba:

- ze zákona povinná hospitalizace na infekčním oddělení
- izolace po dobu 7 dnů od objevení vyrážky
- u nekomplikovaných spalniček – symptomatická (klid na lůžku, srážení teploty, přísun tekutin...), u komplikací – léčba antibiotiky

Prevencí onemocnění je očkování.

V případě, že máte výše uvedené příznaky onemocnění Vy, nebo Vaše děti, které nebyly proti spalničkám očkovány, nebo dospělí očkováni pouze jednou dávkou, dodržte tato opatření:

- nechoďte do ordinace
- spojte se telefonicky s ošetřujícím lékařem, nebo s lékařem infekčního oddělení a postupujte dle jejich pokynů



Zdroj: www.vakcinace.eu/novinky

