

Spalničky nehledí na věk

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje od začátku letošního roku zaznamenává již 5 onemocnění spalničkami. Ve 4 případech se jednalo o dospělé osoby, z toho 3x s importovanou nákazou ze zemí, kde probíhají epidemie spalniček (Ukrajina, Anglie), 1x o kontakt s nemocným, u kterého byly spalničky laboratorně potvrzeny. V měsíci srpnu onemocněla spalničkami 6-letá holčička, která proti spalničkám nebyla očkována v rámci povinného očkování.



Obrázek 1 Spalničky

Zdroj: <http://www.danieldrazan.cz/original/a22bf55>

Informace o způsobu přenosu onemocnění spalničkami, příznaky, komplikace, prevence proti onemocnění a nejčastější otázky naleznete na těchto odkazech:

http://www.khsova.cz/docs/01_aktuality/files/spalnicky_letak_ecdc.pdf

<http://www.khsova.cz/homepage/detail-aktuality/12358>

Celosvětový výskyt spalniček monitoruje v rámci systému epidemiologické bdělosti Světová zdravotnická organizace, aktuální data výskytu onemocnění naleznete zde:

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/

Doporučení KHS:

Vzhledem k epidemiologické situaci výskytu spalniček v okolních Evropských státech a v České republice doručujeme osobám, zejména ve věkové skupině 30 až 49 let, pracujícím ve zdravotnictví, sociálním pracovníkům, zaměstnancům integrovaných záchranných systémů, vojákům, příslušníkům vězeňských služeb, apod. podrobit se očkování proti spalničkám, případně si nechat laboratorně vyšetřit hladinu ochranných protilátek.

Upozorňujeme rodiče neočkovaných dětí, že spalničky jsou závažné vysoce nakažlivé onemocnění, které může vést k život ohrožujícím komplikacím zejména u dětí do 6 let věku. Vzácnou, ale velmi vážnou pozdní komplikací po onemocnění spalničkami, na kterou se zapomíná je subakutní sklerozující panencefalitida. Jedná se o smrtelné onemocnění, jehož rozvoj nastává cca 2 až 8 roků po počáteční naze, kdy k úmrtí dochází za 1-3 roky po nástupu onemocnění.

Jelikož se spalničky vyskytují ve sporadických případech v celé České republice a v menších či větších epidemiích celosvětově a to i v okolních vyspělých Evropských státech doporučujeme jedincům vnímavým k naze spalničkami se nechat proti spalničkám před cestou naočkovat.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi nakažlivé onemocnění, šířící se zejména kapénkami, jedinou účinnou prevencí je očkování.